

PROYECTO DE ROTULO/PROSPECTO

BAYASPIRINA C CALIENTE

ASPIRINA 500 mg


VITAMINA C 200 mg

Granulado

Analgésico – Antifebril - Antiinflamatorio

Venta libre

Industria Argentina



COMPOSICION

Cada sobre contiene:

Aspirina	500 mg
Acido ascórbico	200 mg
Acido cítrico anh.	90 mg
Sacarina	15 mg
Esencia de naranja	400 mg
Esencia de limón	70 mg
Sacarosa	2.000 mg
Citrato de sodio	110 mg

ACCION TERAPEUTICA

Analgésico, antifebril, antiinflamatorio.

USO DEL MEDICAMENTO: lea detenidamente esta información

BAYASPIRINA C CALIENTE está indicada para el alivio sintomático de dolores de cabeza, estados gripales y resfríos que se acompañan de mal estado general y/o fiebre, y para reducir la fiebre.

COMO USAR ESTE MEDICAMENTO

Adultos y mayores de 15 años: El contenido de 1 sobre, disuelto en 150 ml de agua caliente, aproximadamente ½ taza, (no utilizar agua hirviendo), se puede repetir cada 6 horas. No exceder de 6 sobres diarios.


Una vez disuelto, tomar tan pronto como sea posible.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Este medicamento no debe administrarse a niños menores de 15 años sin consultar al médico. Consulte al médico si el dolor persiste más de 5 días, o si la fiebre persiste por más de 3 días; si se observa empeoramiento de los síntomas o aparición de nuevos síntomas consulte al médico inmediatamente.

BAYER S.A.
CYNTHIA TESTOLIN
FARMACEUTICA
M.N. 13.481
APODERADA

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3682 - ROSARIO
JOSE LUIS STELLA
FARMACEUTICO
DIRECTOR TECNICO
MATRICULA NACIONAL N° 11.243
C.E.D.A. COA. ES. AS. N° 10.111



No use este medicamento en caso de hipersensibilidad conocida al ácido acetilsalicílico u otros salicilatos, vitamina C; en presencia de trastornos hemorrágicos; úlceras gástricas o duodenales, insuficiencia renal y/o hepática; personas con antecedentes de nefrolitiasis (cálculos renales) con oxaluria, ni en casos de uremia y de hemocromatosis.

En caso que aparezcan molestias gastrointestinales, erupciones cutáneas, dificultades respiratorias, vértigo, consulte con el médico.

Si padece asma, diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota, hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea; consulte con el médico.

No administre este medicamento a menores de 15 años en caso de síntomas de GRIPE o VARICELA ya que puede incrementar el riesgo a desarrollar SÍNDROME DE REYÉ.

Las personas de edad avanzada no deben tomar este medicamento sin consultar al médico, ya que son más propensas a padecer efectos adversos.

Si usted consume 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día, consulte con su médico.

Dado que la vitamina C puede inducir una mayor absorción de hierro, se requiere prudencia en casos de hemocromatosis o de ciertas enfermedades como β -talasemia.

La vitamina C puede obstaculizar la determinación de glucosa en orina. Cuando se investiga presencia de sangre en heces, la vitamina C puede llegar a producir resultado falso negativo.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar, consulte con su médico antes de ingerir este medicamento.

REACCIONES ADVERSAS

Hipersensibilidad (urticaria, picazón), náuseas, vómitos, irritación gástrica con o sin pérdida de sangre por materia fecal, alteraciones sanguíneas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No debe ser tomado con anticoagulantes, hipoglucemiantes orales, diuréticos, antianginosos, corticoides.

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de tomar este producto a fin de evaluar posibles interacciones.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Intoxicaciones:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata (0221) 451-5555

Consultas o sugerencias: llame sin cargo al 0800 888 8020 de lunes a viernes de 9 a 16 hs.

Este medicamento como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

BAYER S.A.
CYNTHIA TESTOLIN
FARMACEUTICA
M.N. 13.481
APODERADA

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 1652 (BARRIO) MARIANO
JOSE LOPEZ ROLE
FARMACEUTICO
DIRECCION GENERAL
MATRICULA NACIONAL N° 13.481
MATRICULA A POSADAS

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Almacenar a temperatura ambiente inferior a 25 °C.

17

PRESENTACIÓN

Envases con 6, 12, 24 y 30 sobres.

® Marca registrada de **Bayer AG**, Alemania.

Fabricado según fórmula original y bajo licencia de **Bayer AG**, Alemania, en calle 8 entre 3 y 5, Parque Industrial Pilar, por BAYER S.A., Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605EHD), Munro, Buenos Aires

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud, certificado N° 35.367.

Fecha de última revisión: 26/01/2007

BAYER S.A.
CYNTHIA TESTOLIN
FARMACÉUTICA
M.N. 13.481
APODERADA

BAYER S.A.
RICARDO GUTIÉRREZ 3652
JOSE LUIS ROLE
FARMACÉUTICO
DIRECTOR TÉCNICO
MATRÍCULA NACIONAL N° 11.124
MATRÍCULA P.I.A. BS. AS. N° 11.124